

Taupin chauve-souris

Stenagostus rhombeus (Olivier, 1790)

Classe : Insecta Ordre : Coleoptera Famille : Elateridae Sous-Famille : Hypnoidinae Tribu : Denticollini Genre : *Stenagostus*

Taille : 15-21 mm.

Diagnose :

Corps allongé, convexe, entièrement brun orangé. La pubescence brune, fine et longue est bien visible et donne un aspect grisâtre à l'exception d'une fascie transverse peu nette au tiers postérieur des élytres. Les antennes longues et dentées à partir du 3ème article dépassent de deux articles le bord postérieur du pronotum qui est peu convexe, transverse avec les angles postérieurs droits et peu étirés. La ponctuation du pronotum est forte et dense. Les appendices sont brun fauve. La larve est filiforme et cylindrique (de type "ver fil-de-fer"), noire dorsalement et pâle ventralement, le dernier segment orné de deux dents.

Identification : Difficile.

Confusions possibles :

S. rufus est plus grand, glabre, rouge-orangé avec les angles postérieurs du pronotum en pointes un peu divergentes.

Périodes d'observation (adultes) : Juillet-août.

Biologie-éthologie :

La larve se développe dans le bois carié des feuillus. Les adultes sont nocturnes, viennent à la lumière et se trouvent sur les feuillages et sous les écorces.

Biogéographie-écologie :

Forêts de plaine et moyenne montagne de toute l'Europe.

Références :

Leseigneur L., 1972. Coléoptères Elateridae de la faune de France continentale et de Corse. Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon (supplément au numéro de février 1972) 41 : 1-381.

Source : fiche descriptive, INPN

<https://biodiversite.parc-naturel-normandie-maine.fr/espece/240499>